

ADAPALENO (P.344 C2)



Fórmula Molecular: $C_{28}H_{28}O_3$

Peso Molecular: 412,52 g/mol

Uso: Externo

Fator de Correção: Não se aplica

Indicações

• O Adapaleno é uma molécula derivada do ácido naftóico, com propriedades biológicas similares às do ácido retinoico. Suas propriedades farmacológicas lhe conferem a habilidade de controlar a proliferação e diferenciação celular, prevenir e eliminar comedões. Também apresenta eficiente atividade antiinflamatória na acne. É indicado para o tratamento tópico da acne vulgaris. Tem-se mostrado mais eficaz quando usado concomitantemente com a clindamicina. O Adapaleno promove a renovação celular da pele, de forma menos agressiva que o ácido retinoico.

Contraindicações

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Também é contraindicado o uso em pacientes hipersensíveis à substância. Não deve ser usado simultaneamente a outros retinoides.

Reações Adversas

O Adapaleno pode provocar coceira, vermelhidão, descamação e queimação em alguns pacientes; nestes casos, recomenda-se a suspensão temporária do medicamento até que a pele se acostume. Deve-se evitar o contato do produto com as mucosas.

Concentração Recomendada

Creme, gel e loções a 0,1%. É aplicado uma vez ao dia, após higienização e antes de dormir. Em algumas circunstâncias, quando o paciente apresenta irritação da pele, a aplicação pode ser feita em dias alternados até que a irritação cesse.

Referências Bibliográficas

BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4ª Ed. 2011.

WEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Adapaleno> (consultado em 08.01.2009).

