

AMITRIPTILINA HCL (P.344)

Psicotrópico



Fórmula Molecular: C₂₀H₂₃N.HCl

Peso Molecular: 313,86

CAS: 549-18-8

DCB: 00712

Uso: Interno

Fator de Correção: Não se aplica

Descrição

Antidepressivo com propriedades ansiolíticas e sedativas (calmante). Assim sendo, este medicamento é utilizado principalmente para o tratamento de depressão, mas também é utilizado para o tratamento de enurese noturna (urinar na cama à noite). A atividade antidepressiva pode se manifestar em três ou quatro dias e pode levar até trinta dias para se desenvolver por completo.

Indicações

- Antidepressivo tricíclico para tratamento de depressão de todos os níveis. Inibe a recaptação neuronal da norepinefrina e de serotonina no SNC.

Contraindicações

O Cloridrato de Amitriptilina não é indicado em pacientes com insuficiência hepática. Em razão da falta de experiência com este medicamento na terapia da depressão infantil, não se recomenda o uso em crianças.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA - Lista C1.

Reações Adversas

Os efeitos adversos mais comuns são secura da boca, constipação, tonturas, zumbidos, dores de cabeça e sedação. Outros sintomas também descritos são aumento de apetite e ganho de peso.

Concentração Recomendada

O Cloridrato de Amitriptilina é indicado em uma faixa de dosagem diária de 30 a 150mg. Inicialmente são administradas dosagens de 25mg, 3 vezes ao dia, podendo ser aumentada gradativamente até 50mg, 3 vezes ao dia. Em adolescentes e pacientes idosos, a dosagem usual é de 30 a 75mg ao dia, dividida em três tomadas ou em dose única ao deitar.

Referências Bibliográficas

BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4ª Ed. 2011.

SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.

ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.